


Behandelprotocol rotkreupel

Rotkreupel is een vervelende besmettelijke tussenkluwhuidaandoening die zorgt voor groeivertraging en verhoogd antibioticagebruik. Bovendien tast een infectie het dierwelzijn aan. Als de rotkreupelbacterie, *Dichelobacter nodosus*, is aangetoond op uw bedrijf kunt u met dit behandelprotocol de bacterie gericht gaan bestrijden.

1. Bekap alle dieren zonder bloedingen te veroorzaken.
2. Leg afwijkingen aan klauwen per dier vast.
3. Ruim het weggesneden hoorn zorgvuldig op.
4. Behandel aangedane dieren/ klauwen adequaat.
5. Deel de dieren op basis van bevindingen en leeftijd in in groepen en breng ze na bekappen en behandelen op schone weide.
6. Ruim de dieren met misvormde klauwen op zodra ze niet meer kreupelen.
7. Laat dieren zonder afwijkingen door een doorloop voetbad met zinksulfaat lopen; herhaal dit een aantal maal gedurende een aantal weken.
8. Voor de schapen die geen afwijkingen leken te hebben geldt eenzelfde voetbadregime als voor de lammeren.
9. Zet schapen en lammeren met afwijkende klauwen in een stabad met zinksulfaat; doe dit voldoende lang en frequent.
10. Controleer na drie weken alle dieren, besnijdt ze, selecteer aangedane dieren uit, pas voetbad toe en plaats ze in schone weide.
11. Houd de dieren die in het begin afwijkende klauwen hadden nog apart en behandel deze dieren, indien nodig, na het besnijden weer.
12. Controleer bovenstaande groep na weer drie weken en besnijdt zododig de klauwtjes opnieuw.
13. Bekappen, voetbaden en omweiden regelmatig herhalen in het jaar na de problemen.
14. Stel in overleg met uw dierenarts een vaccinatieplan op.
15. Pas strikte quarantaine toe van minimaal twee weken van alle aan te voeren dieren.

In grote koppels en in chronische gevallen blijft rotkreupel, zonder een stipt doorgevoerde behandeling, een vervelende kwaal die je gemakkelijk oploopt, maar waar je niet eenvoudig weer vanaf komt. Bij de laatste groep bedrijven is daarom het najaar en de winter het beste moment om rotkreupel goed aan te pakken: dan komen de laagste aantallen dieren voor op het bedrijf en de buitentemperatuur is zodanig laag dat rotkreupel zich niet of bijna niet meer uitbreidt.



Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/rotkreupel