

Bijlage 1.

Zo herkent u mond- en klauwzeer bij varkens

Mond- en klauwzeer kan optreden bij koeien, geiten, schapen en varkens. De ene diersoort kan de ziekte overdragen op de andere.

Symptomen bij het varken zijn:

- plotselinge kreupelheid
- niet eten
- koorts
- sloom
- blaren: kroonranden, tussenklauwspleet, bek, snuit, lippen, spenen
- wil graag liggen (gillen bij opjagen)
- sterfte, vooral bij biggen in het kraamhok

Met name varkens zorgen voor een grote hoeveelheid virusdeeltjes in de lucht. Vervolgens zullen met name runderen door besmette lucht worden geïnfecteerd. In het algemeen zijn de symptomen onduidelijk. De blaarvorming treedt in hoofdzaak op rond de klauwen en zijn alleen zichtbaar bij nauwkeurige inspectie van schone klauwen.

Let op: de symptomen van blaasjesziekte en mond- en klauwzeer zijn vrijwel identiek. Elke klinische verdenking dient onmiddellijk te worden gemeld!



Varkens met 3 dagen oude wonden op de kroonrand van klauwen en bijklauwen.



Varken met 1 dag oude intacte blaren op de neus.



Varken met 2 dagen oude blaren.



Varkens met 8 dagen oude wonden met beginnende ontschoening, uitgebreide korstvorming en herstel.