

Bemonsteringsprotocol 'Fipronil-resten in de uitloopruimte'

Motivatie:

De uitloop kan besmet zijn met fipronil, doordat de kippen mest en urine met fipronil hebben uitgescheiden in de uitloopruimte. Het is daarom aan te raden de uitloop te laten onderzoeken op het gehalte fipronil in de bodem..

Benodigde materialen:

- 2 sets handschoenen
- 1 pot voor grondmonster
- inzendformulier
- verpakkingsmateriaal

Bemonsteringsprotocol:

1. Neem 40 grondmonsters:
 - a. Verdeeld over de lengte en breedte van het uitloop terrein en bemonster de grond achter de luchtuitlaat.
 - b. Neem het monster door middel van steken (monster van ong. 1 cm doorsnede, 2 tot 5 cm diep, dit kan met een grondboor of bijv. met een appelboor).
2. Maak een mengmonster van ongeveer 250 gram grond.
3. Noteer op het potje het UBN en de identificatie van de stal.
4. Verzend het potje met het bijbehorende inzendformulier fipronil en formulier nieuwe klant naar het laboratorium voor analyse op fipronil en metabolieten.

Groen Agro Control
Distributieweg 1
2645EG Delfgauw

Versie 21 augustus 2017

Ruth Bouwstra, Jeanine Wiegel, Guillaume Counotte, Rob Vriens.