

# Scorekaart Udder Cleft Dermatitits (UCD)




## Score 0: geen UCD

Er zijn geen zichtbare afwijkingen aan de huid.



## Score 1: milde UCD

De huid is intact. Er is sprake van roodheid, kaalheid, vochtophoping en/of kleine korstjes.



## Score 2: ernstige UCD

De huid is niet intact. Er is sprake van een open wond. De wondranden wijken en het wondbed is zichtbaar.

Datum

Naam veehouder

### Tips:

- Gebruik een spiegel op een stok of selfstick om te scoren. Scoor alle koeien
- Noteer de nummers van de koeien met milde en ernstige UCD
- Behandel alle koeien met milde of ernstige UCD
- Monitor regelmatig om nieuwe gevallen tijdig te ontdekken
- Overleg met uw dierenarts voor de beste behandeling

### Noteer hier de nummers van de koeien met milde UCD

Koenummers	Aantal koeien met score 1	score
	Aantal beoordeelde koeien	%
		norm = <5%

### Noteer hier de nummers van de koeien met ernstige UCD

Koenummers	Aantal koeien met score 2
	norm = 0

Raadpleeg de dierenarts wanneer meer dan 5% van de dieren milde UCD heeft en wanneer er dieren met ernstige UCD op het bedrijf zijn.

# Udder Cleft Dermatitis (UCD)

**Udder Cleft Dermatitis (UCD) is een regelmatig voorkomende aandoening van de uier bij melkgevende koeien. Het is een ontsteking van de huid ter hoogte van de vooruier. Meestal begint de aandoening tussen de twee voorkwartieren of op de overgang van de voorkwartieren naar de buikhuid. UCD is iets anders dan 'uiersmet'. Dit wordt vaker gezien bij vaarzen met veel oedeem of zucht in de uier en bevindt zich op de uierhuid van de achterkwartieren en de huid van de liezen tussen de achterbenen en uier.**

De ernst van UCD varieert van mild tot ernstig. In milde gevallen is er sprake van (matige) aantasting van de huid, zoals roodheid, kaalheid, vochtophoping of kleine korstjes, maar is deze nog wel intact. In ernstige gevallen kan de ontsteking de huid doorbreken. Dit kan leiden tot complicaties, zoals ontsteking van de bloedvaten. Ontstoken bloedvaten kunnen bloedstolsels met bacteriën verspreiden naar andere organen, zoals de longen, wat fatale gevolgen kan hebben. Hoeveel dieren milde of ernstige UCD hebben verschilt per bedrijf. Dieren die eenmaal UCD hebben, komen er niet eenvoudig vanaf. De kans op spontane genezing is laag, waardoor deze dieren vaak langdurig een milde of ernstige vorm van UCD hebben. UCD wordt voornamelijk gezien bij koeien vanaf de derde lactatie. Ondanks de locatie dicht bij de uier leidt het niet tot een verhoogd celgetal.

## Speelt UCD op jouw bedrijf?

De aanpak van UCD op melkveebedrijven begint met tijdig herkennen en behandelen van milde

gevallen. Het monitoren van de hele koppel is belangrijk om milde gevallen op te sporen. Door deze milde gevallen adequaat te behandelen (en te genezen) helpt om ernstige gevallen te voorkomen. De locatie van de huid aantasting is moeilijk zichtbaar. Om dieren goed te controleren is een spiegeltje op een stok of selfie stick nodig. Dit kan tijdens het melken of door de koeien tijdelijk vast te zetten aan het voerhek. Gebruik de scorekaart op de achterzijde om de ernst te bepalen en noteer welke koeien UCD hebben en in welke mate.

## UCD vastgesteld, en nu?

Alle koeien met milde of ernstige UCD moeten behandeld worden. De behandeling van UCD bestaat uit de volgende stappen:

1. Schoonmaken van de huid aantasting met povidonjodiumoplossing /-shampoo (geen tinctuur!);
2. Vuil, haar en losse korsten voorzichtig verwijderen;

3. De huid drogen met een papieren doek;
4. Probeer bloeden te voorkomen;
5. Insmeren met een milde, niet vette zalf;
6. Er is voor ernstige UCD (open wond) een geregistreerde zalf beschikbaar.

Monitor regelmatig om nieuwe gevallen tijdig te ontdekken. Raadpleeg de dierenarts wanneer meer dan 5% van de dieren milde UCD heeft en wanneer er dieren met ernstige UCD op het bedrijf zijn.

## Wat is de prognose van UCD?

Ernstige gevallen van UCD hebben meer kans op complicaties. Het herstel duurt langer en de kans op volledig herstel is kleiner. Bovendien is er meer kans dat de aandoening later weer terugkomt. Het herstel van grote wonden kan soms wel weken tot maanden duren. De grootte van de wond zegt niet altijd iets over de aantasting van onderliggende weefsels en vaatstructuren. Het is daarom belangrijk om ook de milde gevallen op te sporen en direct met de nodige zorg te behandelen, zodat ze kunnen genezen en niet verder ontwikkelen tot een ernstig geval.



## Betsie Krattley

Betsie Krattley is rundveedierenarts bij GD. In haar dagelijkse werk houdt ze zich bezig met het adviseren van veehouders en dierenartsen op het gebied van uiergezondheid. Op onze website vind je een praktisch video waarin Betsie laat zien hoe je UCD kunt herkennen en hoe kun je dit het beste kunt behandelen.

Scan de QR code om de video te bekijken



Meer informatie vindt u op:  
[www.gddiergezondheid.nl/ucd](http://www.gddiergezondheid.nl/ucd)

GD LOOPT VOOROP IN UIERGEZONDHEID  
VOOR GEZONDE UIERS EN MEER MELK

